

# Cáncer Cervicouterino

REDUCE TU RIESGO



La mejor protección contra el cáncer cervicouterino es la vacuna del VPH\* y las pruebas regulares de detección.

- Niños y niñas deberían completar la serie de vacunas de VPH a los 11 o 12 años de edad.
- Las mujeres deberían hacerse la prueba de VPH y la de cáncer.
- Si fumas, déjalo. Si no fumas, no empieces.

La vacuna del VPH puede prevenir cerca de 90% de cánceres cervicouterinos y otros tipos de cánceres en hombres y mujeres.

La vacuna del VPH puede ser dada tan temprano como a los 9 años y hasta los 26 años a las mujeres y hasta los 21 años a los hombres.

\*VPH – Virus del Papiloma Humano

## Guía para las pruebas de detección

### • De 21 a 29 años

Obtén la prueba del Papanicolaou cada tres años.

### • De 30 a 65 años

Obtén la prueba del Papanicolaou y la prueba VPH cada cinco años.

### • Después de los 65 años

El MD Anderson no recomienda pruebas de detección para la mayoría de las mujeres después de los 65 años de edad. Habla con tu médico acerca de las recomendaciones para las pruebas de detección.

THE UNIVERSITY OF TEXAS

**MD Anderson ~~Cancer~~ Center**

Making Cancer History®

# Casi todos los cánceres cervicouterinos son causados por el virus VPH.

## Factores de riesgo

- VPH
- Sistema inmunológico débil por medicamentos
- Infección del VIH
- Historia de displasia cervical, condición pre-cancerosa
- Fumar

## Signos de advertencia

- Secreción vaginal excesiva
- Sangrado después de relaciones sexuales
- Sangrado anormal entre períodos

Habla con tu médico si notas algo inusual o si tienes uno o más factores de riesgo de cáncer cervicouterino



Nuestros especialistas de prevención de cáncer son expertos en reducción del riesgo a cáncer y detección temprana.

**Citas disponibles**  
**713-745-8040**

THE UNIVERSITY OF TEXAS  
**MD Anderson**  
**Cancer Center**

Making Cancer History®